

PRIMA PARTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA



2008

2008

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA

dati relativi all'anno 2008

2008



Tutti i contenuti di questa pubblicazione
sono scaricabili dal sito:

www.politicheantidroga.it
www.drona.org

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Antidroga
Via delle Vite, 13 • 00187 Roma
tel. 06/67796350 - fax. 06/67796843
dipartimentoantidroga@governo.it



Dati generali

- I soggetti tossicodipendenti totali stimati, in Italia, che avrebbero bisogno di trattamento (per l'uso di oppiacei o cocaina) sono circa **385.000**
- **210.000** consumatori di **oppiacei** di cui **123.800 (59%)** in trattamento
- **172.000** consumatori problematici di **cocaina** di cui circa **27.900** in trattamento (16,2%).



I.1. CONSUMO DI DROGA



Uso di sostanze almeno una volta nella vita

popolazione generale (15-64 anni) - IPSAD

1,6% per l'eroina,
7% per la cocaina,
32% per la cannabis

popolazione studentesca (15-19 anni) - ESPAD



2,1% per l'eroina
5,9% per la cocaina
31,5% per la cannabis





POPOLAZIONE GENERALE

STUDENTI



EROINA



COCAINA



CANNABIS





POPOLAZIONE GENERALE



STUDENTI



STIMOLANTI



ALLUCINOGENI



I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale

I.1.1.1 Consumi di eroina



EROINA: Tre sottolineature

POP. GENERALE

- Il consumo è del 1,6%, almeno una volta nella vita e solo lo 0,1% consuma frequentemente
- Prevalente l'uso nel sesso maschile
- Ripresa dei consumi



Figura I.1.1: Consumo di **eroina nella popolazione generale (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni) - Anni 2007 - 2008**








Figura I.1.2: Consumo di **eroina** nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2008



Fonte: Elaborazione sui dati IPSAD-Italia 2001-2008



Figura I.1.3: Consumo di **eroina** nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi).
Distribuzione per genere e classi d'età





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale

I.1.1.2 Consumi di cocaina



COCAINA: Tre sottolineature

POP. GENERALE

- Il consumo è del 7%, almeno una volta nella vita
- Circa il doppio rispetto alla media europea
- Più alto l'uso nel genere femminile rispetto all'eroina



Figura I.1.5: Consumo di cocaina nella popolazione generale (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni)






Figura I.1.6: Consumo di cocaina nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2008







Figura I.1.7: Consumo di cocaina nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi) nei vari paesi europei. Anni 2001 - 2008



Fonte: Rapporto annuale OEDT 2008



Figura I.1.8: Consumo di **cocaina** nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi).
Distribuzione per genere e classi d'età







Figura I.1.9: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cocaina nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale

I.1.1.3 Consumi di cannabis



CANNABIS: Tre sottolineature

POP. GENERALE

- 32% della popolazione generale ha usato cannabis, almeno una volta nella vita
- 6,9 % negli ultimi 30 gg ma l'1,34% la utilizza frequentemente
- Più alto il consumo di cannabis nella popolazione italiana rispetto alla media europea



Figura I.1.10: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni)






Figura I.1.11: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere. Anni 2001 - 2008






Figura I.1.12: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi) nei vari paesi europei. Anni 2001 - 2008






Figura I.1.13: Consumo di cannabis nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età







Figura I.1.14: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di **cannabis** nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale

I.1.1.4 Consumi di stimolanti



STIMOLANTI: Tre sottolineature

POP. GENERALE

- 3,8 % della popolazione generale ha usato stimolanti (amfetamine, ecstasy, GHB, ecc.), almeno una volta nella vita
- 0,04 % uso frequente negli ultimi 30 gg
- Più basso l'uso di stimolanti nella popolazione italiana rispetto alla media europea



Figura I.1.15: Consumo di **stimolanti** nella popolazione generale (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)




Figura I.1.16: Consumo di **stimolanti** nella popolazione generale negli ultimi 12 mesi






Figura I.1.17: Consumo di **stimolanti** nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età







Figura I.1.18: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di **stimolanti** nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga nella popolazione generale

I.1.1.5 Consumi di allucinogeni



ALLUCINOGENI: tre sottolineature

POP. GENERALE

- 3,5 % della popolazione generale ha usato allucinogeni almeno una volta nella vita
- 0,04 % uso frequente negli ultimi 30 gg



Figura I.1.19: Consumo di **allucinogeni** nella popolazione generale (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi e negli ultimi trenta giorni)







Figura I.1.20: Distribuzione percentuale della frequenza di utilizzo fra i consumatori di allucinogeni nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.1. Consumo di droga
nella popolazione generale, 15-64 aa

I.1.1.6 Policonsumo



- Forte tendenza al policonsumo:

POP. GENERALE

- Consumatori di **cannabis**:
 - 12,7% anche **cocaina**
 - 3,1% anche **eroina**
- Consumatori di **cocaina**:
 - 84,8% anche **cannabis**
 - 14,6% anche **eroina**
- Consumatori di **eroina**
 - 76,8% anche **cannabis**
 - 51,8% anche **cocaina**

NB: Forte associazione con alcol e tabacco a tutte le sostanze




Tabella I.1.1: Distribuzione della prevalenza condizionata di **policonsumatori** nella popolazione generale 15-64 anni negli ultimi 12 mesi

Sostanze	Alcol	Tabacco (\geq sigaretta/die)	Cannabis	Cocaina	Eroina
Cannabis	98,9	58,9	-	12,7	3,1
Cocaina	97,6	73,8	84,8	-	14,6
Eroina	87,3	66,7	76,8	51,8	-



Figura I.1.42: Poliassunzione (dati IPSAD - età 25–64 esclusa classe età 15-24)





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani 15 – 19 aa (ESPAD condotto nell'anno 2008)



I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio ESPAD)

I.1.2.1 Consumi di eroina



EROINA: Tre sottolineature

GIOVANI

- Il consumo è del 2,1 % (VS 1,6% pop. gen.), almeno una volta nella vita e solo lo 0,3 % (VS 0,1% pop. gen.), consuma frequentemente
- Prevalente l'uso nel sesso maschile
- Trend dei consumi in diminuzione



Figura I.1.21: Consumo di **eroina** nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)






Figura I.1.22: Consumo di **eroina** nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età

maggior interessamento delle femmine nelle fasce più giovani rispetto a quelle più adulte







Figura I.1.23: Consumo di **eroina** nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2000 – 2008




Tabella I.1.2: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di **eroina** una o più volte negli ultimi 12 mesi - ESPAD

Eroina	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi	1,58	1,59	0,01	0,7
Femmine	1,2	1,0	0,2	-14,4
Totale	1,4	1,3	0,1	-7,9



Figura I.1.24: Distribuzione della frequenza di consumo fra i consumatori di eroina nella popolazione studentesca (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio ESPAD)

I.1.2.2 Consumi di cocaina



COCAINA: Tre sottolineature

GIOVANI

- Il consumo è del 5,8% (VS 7% pop. gen.), almeno una volta nella vita e solo lo 0,5 % (VS 0,07% pop. gen.), consuma frequentemente
- Prevalente l'uso nel sesso maschile
- Riduzione dei consumi (VS aumento nelle fasce adulte)



Figura I.1.25: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)






Figura I.1.26: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età






Figura I.1.27: Consumo di cocaina nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi).
Anni 2000 - 2008






Tabella I.1.3: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di **cocaina** una o più volte negli ultimi 12 mesi - ESPAD


Cocaina	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi	5,3	4,6	0,7	-12,8
Femmine	3,2	2,6	0,6	-18,3
Totale	4,2	3,6	0,6	-13,1



- Tra gli studenti consumatori di cocaina durante l'ultimo anno, il 18% dei maschi ed il 15% delle femmine ha utilizzato la sostanza 20 o più volte, mentre per il 59% dei consumatori di entrambi i generi si è trattato di un consumo occasionale (da 1 a 5 volte).



Figura I.1.28: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di cocaina nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio ESPAD)

I.1.2.3 Consumi di cannabis



CANNABIS: Tre sottolineature

GIOVANI

- Il consumo è del 31,5% (VS 32% pop. gen.), almeno una volta nella vita e solo lo 2,7% (VS 1,34% pop. gen.), consuma frequentemente
- Maggior consumo = 19 aa (40,1%)
- Uso precoce: 20% dei maschi di 16 anni
- Ripresa dei consumi



Figura I.1.29: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo giornaliero)






Figura I.1.30: Consumo di **cannabis** nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età






Figura I.1.31: Consumo di cannabis nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2000 - 2008

Lieve aumento dei consumi di cannabis nel 2008 soprattutto nel genere femminile







Tabella I.1.4: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di **cannabis** una o più volte negli ultimi 12 mesi – ESPAD

Cannabis	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi	26,9	27,6	0,6	+2,4
Femmine	19,1	20,4	1,3	+6,9
Totale	23,0	24,2	1,2	+5,3



Figura I.1.32: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di **cannabis** nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio ESPAD)

I.1.2.4 Consumi di stimolanti



STIMOLANTI: Tre sottolineature

GIOVANI

- Il consumo è del 4,7% (VS 3,8% pop. gen.), almeno una volta nella vita e solo lo 0,9 % (VS 0,04% pop. gen.), consuma frequentemente
- Aumento dell'uso al crescere dell'età
- Diminuzione dei consumi



Figura I.1.33: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)






Figura I.1.34: Consumo di stimolanti nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età






Figura I.1.35: Consumo di **stimolanti** nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2008







Tabella I.1.5: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di stimolanti una o più volte negli ultimi 12 mesi - ESPAD

Stimolanti	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi	4,0	3,6	0,4	-10,7
Femmine	2,3	2,1	0,2	-9,8
Totale	3,2	2,9	0,3	-10,4



Figura I.1.36: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella popolazione studentesca (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio ESPAD)

I.1.2.5 Consumi di allucinogeni



ALLUCINOGENI: Tre sottolineature

GIOVANI

- Il consumo è del 4,7% (VS 3,5% pop. gen.), almeno una volta nella vita e solo lo 0,5% (VS 0,04% pop. gen.), consuma frequentemente
- Prevalente l'uso nel sesso maschile
- Aumento lento ma costante dei consumi dal 2005



Figura I.1.37: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata (una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi trenta giorni, consumo frequente)






Figura I.1.38: Consumo di allucinogeni nella popolazione scolarizzata (una o più volte negli ultimi 12 mesi). Distribuzione per genere e classi d'età






Figura I.1.39: Consumo di **allucinogeni** nella popolazione scolarizzata (almeno una volta negli ultimi 12 mesi). Anni 2003 - 2008





Tabella I.1.6: Confronto dei dati 2007-2008 relativi alle prevalenze del consumo di **allucinogeni** una o più volte negli ultimi 12 mesi - ESPAD

Allucinogeni	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Maschi	3,6	3,8	0,2	+5,7
Femmine	1,92	1,95	0,03	+1,7
Totale	2,7	2,9	0,2	+6,3



Figura I.1.40: Distribuzione della frequenza di utilizzo fra i consumatori di stimolanti nella popolazione generale (almeno una volta negli ultimi 12 mesi)





I.1. CONSUMO DI DROGA

I.1.2. Consumo di droga nelle scuole e tra i giovani (studio ESPAD)

I.1.2.6 Policonsumo nella fascia 15-19



Forte tendenza al policonsumo:

GIOVANI

- Consumatori di **cannabis**:
 - 14,1% anche **cocaina**
 - 4,4% anche **eroina**
- Consumatori di **cocaina**:
 - 91,9% anche **cannabis**
 - 23,6% anche **eroina**
- Consumatori di **eroina**
 - 82,3% anche **cannabis**
 - 66,7% anche **cocaina**

Forte associazione con alcol e tabacco di tutte le sostanze




Tabella I.1.7: Distribuzione della prevalenza condizionata di policonsumatori nella popolazione scolarizzata negli ultimi 12 mesi (last year prevalence)

Sostanze	Alcol	Tabacco (\geq sigaretta/die)	Cannabis	Cocaina	Eroina
Cannabis	98,3	68,4	-	14,1	4,4
Cocaina	98,0	80,9	91,9	-	23,6
Eroina	96,2	71,2	82,3	66,7	-

- **Cannabis: droga “trasversale”**



Figura I.1.41: Poliassunzione (dati ESPAD - età 15 – 19)



Fonte: Elaborazione sui dati ESPAD Italia 2008



Figura I.1.41: confronto Poliassunzione gruppi studenti – pop. generale






Tabella I.1.9: Confronto riepilogativo dei dati 2007 e 2008 relativi alle prevalenze del consumo di sostanze (eroina, cocaina, cannabis) negli ultimi 12 mesi nella popolazione giovanile 15-19 anni - ESPAD 2007-2008


Sostanze	Anno		Variazione 2007 vs 2008	
	2007	2008	valore assoluto	valore %
Eroina	1,4	1,3	0,1	-7,9
Cocaina	4,2	3,6	0,6	-13,1
Cannabis	23,0	24,2	1,2	5,3
Stimolanti	3,2	2,8	0,4	-10,4
Allucinogeni	2,7	2,9	0,2	6,3




Figura I.1.43: Uso di sostanze (una o più volte negli ultimi 12 mesi) secondo il genere nella popolazione generale (figura a sinistra) e nella popolazione scolarizzata (figura a destra)

EROINA

POPOLAZIONE GENERALE




STUDENTI






COCAINA

POPOLAZIONE GENERALE




STUDENTI





CANNABIS

POPOLAZIONE GENERALE



STUDENTI






Figura I.1.44: Differenze della prevalenza di consumo di **eroina** una più volte negli ultimi 12 mesi nella popolazione generale per classi di età - Anni 2007 - 2008






Figura I.1.45: Differenze della prevalenza di consumo di **cocaina** una o più volte negli ultimi 12 mesi nella popolazione generale per classi di età - Anni 2007 - 2008






Tabella I.1.10: Prevalenza dell'uso di sostanze stupefacenti nella popolazione generale (15-64 anni) e popolazione scolarizzata (15-19 anni) – Anno 2008

POPOLAZIONE GENERALE						
Sostanza	NON USO (%)			USO (%)		
	una o più volte nella vita	ultimi 12 mesi	ultimi 30 gg	una o più volte nella vita	ultimi 12 mesi	ultimi 30 gg
Eroina	98,4	99,6	99,9	1,6	0,4	0,2
Cocaina	93,1	97,9	99,3	7,0	2,1	0,7
Cannabis	68,0	85,7	93,1	32,0	14,3	6,9
Stimolanti	96,2	99,3	99,8	3,8	0,7	0,2
Allucinogeni	96,5	99,4	99,8	3,5	0,7	0,2



Tabella I.1.10: Prevalenza dell'uso di sostanze stupefacenti nella popolazione generale (15-64 anni) e popolazione scolarizzata (15-19 anni) – Anno 2008

POPOLAZIONE SCOLARIZZATA						
Sostanza	NON USO (%)			USO (%)		
	una o più volte nella vita	ultimi 12 mesi	ultimi 30 gg	una o più volte nella vita	ultimi 12 mesi	ultimi 30 gg
Eroina	97,9	98,7	99,2	2,1	1,3	0,8
Cocaina	94,2	96,4	98,2	5,8	3,7	1,9
Cannabis	68,5	75,8	84,8	31,5	24,2	15,2
Stimolanti	95,3	97,2	98,5	4,7	2,8	1,5
Allucinogeni	95,3	97,1	98,7	4,7	2,9	1,3



I.2. SOGGETTI CON BISOGNO DI TRATTAMENTO

I.2.1. Prevalenza ed incidenza da fonti sanitarie

I.2.1.3 Stime di incidenza di utilizzatori di eroina che richiederanno trattamento



Nuove richieste di trattamento

- Indicatore “incidenza di uso problematico”
- **Nuove richieste** di trattamento per uso di eroina in diminuzione: nel 2008 stimati circa **18.600 soggetti**

Figura I.2.5: Nuove richieste di trattamento per sostanza primaria “**eroina**” – Anni 1998 - 2008






Figura I.2.7: Utenti in trattamento presso i Servizi per le tossicodipendenze secondo il tipo di contatto - Valori assoluti e valori indicizzati (Anno base 2000 = 100) - Anni 2000 - 2008

costante aumento
casi incidenti – nuovi
pazienti







Figura I.2.10: Età media degli utenti in trattamento presso i Servizi per le tossicodipendenze secondo il tipo di contatto e il genere – Anni 1991 - 2008

- Aumento dell'età media di primo accesso ai servizi
- Aumento del tempo fuori trattamento





Tre sottolineature

- **Abbassamento dell'età di inizio**
- **Aumento dell'età media di primo accesso ai servizi**
- **Aumento del tempo fuori trattamento**



I.2. SOGGETTI CON BISOGNO DI TRATTAMENTO


I.2.1. Prevalenza ed incidenza da fonti sanitarie

I.2.2.2 Assunzione di sostanze stupefacenti



Figura I.2.11: Utenti in trattamento presso i servizi per le tossicodipendenze secondo la sostanza d'abuso primaria in Italia (dati 2008) ed Europa (dati 2006)

- Sostanze maggiormente utilizzate: eroina, cocaina, cannabis
- Caratteristica italiana: maggior uso di eroina, minor uso di cannabis e amfetamine



Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze – Bollettino Statistico 2008




Tre sottolineature

- Aumento del 1,9% della **cocaina** come droga primaria
- Importante uso secondario di cocaina
- Cocaina nel 12% anche per via iniettiva



Figura I.2.12: Distribuzione percentuale degli utenti in trattamento presso i Servizi per le tossicodipendenze secondo la sostanza primaria. Anni 1991 - 2008


- Uso di eroina: tendenza alla stabilizzazione negli ultimi 3 anni
- Aumento dell'uso di cocaina



Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Figura I.2.13: Percentuale di utenti in trattamento per sostanza primaria di eroina e cocaina. Anno 2008


- Regioni con % > **eroina**: Umbria, TN - BZ, Basilicata, Calabria
- Regioni con % > **cocaina**: Lombardia, Molise, Sicilia



Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Figura I.2.14: Percentuale di utenti in trattamento per sostanza primaria cannabis e altre sostanze. Anno 2008

- Regioni con % > **cannabis**: Veneto, Friuli, Puglia
- Regioni con % > **altre sostanze**: Abruzzo, Piemonte



Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Figura I.2.16: Andamento dell'uso iniettivo per tipo di sostanza. Anni 1997 - 2008

- Diminuzione dell'uso iniettivo dell'eroina






Figura I.2.24: Andamento delle diverse vie di assunzione dell'eroina - anni 2006, 2007, 2008 - percentuale.







Figura I.2.19: Età di primo uso, età di primo trattamento, età media dell'utenza in trattamento, tempo di latenza e periodo medio di presa in carico per tipo di sostanza. Anno 2008



Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico DPA sui Ser.T.




Associazioni tra sostanze

- **Eroina** sostanza primaria:

forte associazione eroina - cocaina - cannabis



Figura I.2.20: Distribuzione percentuale di utenti che assumono **oppiacei** come sostanza primaria e percentuale di utenti secondo l'uso di sostanze secondarie - Anno 2008



Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico DPA sui Ser.T.






Associazioni tra sostanze

- **Cocaina** sostanza primaria:

forte associazione cocaina, cannabis e alcol



Figura I.2.21: Distribuzione percentuale di utenti che assumono **cocaina** come sostanza primaria e percentuale di utenti secondo l'uso di sostanze secondarie - Anno 2008



Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico DPA sui Ser.T.




Associazioni tra sostanze

- Cannabis sostanza primaria:

associazione prevalente con cocaina e alcol



Figura I.2.22: Distribuzione percentuale di utenti che assumono **cannabis** come sostanza primaria e percentuale di utenti secondo l'uso di sostanze secondarie - Anno 2008



Fonte: Elaborazione su dati studio multicentrico Ser.T.




I.3. IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE

I.3.1. Malattie infettive droga correlate

I.3.1.1. Diffusione HIV e AIDS



Figura I.3.1: Tasso di incidenza (casi x 1.000.000 ab.) di casi AIDS tra i consumatori di stupefacenti per via iniettiva nei Stati membri dell'EU. Anni 1996 - 2006



Fonte: Osservatorio Europeo per le Droghe e le Tossicodipendenze – Bollettino Statistico 2008



Test HIV

Caratteristiche	Nuovi utenti	Utenti già in carico	Totale
Positività Test HIV (% positivi su testati)			
Maschi	2,9	12,8	11,07
Femmine	2,9	20,7	17,40
Totale	2,9	14	11,98

- Maggior prevalenza di HIV nel genere femminile



Figura I.3.2: Utenti sottoposti a test sierologico HIV sul totale assistiti e percentuale utenti positivi al test sul totale soggetti testati. Anni 1991 - 2008

- Basso numero di soggetti esaminati
- Trend in costante diminuzione dell'utilizzo del test HIV







Figura I.3.3: Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale soggetti testati, secondo il genere e il tipo di contatto con il servizio. Anni 1991 - 2008






Relazione tra basso livello di utilizzo del test e % di HIV positivi

- Situazioni critiche per maggior positività per HIV e contemporaneo minor uso del test:
 - Emilia Romagna
 - Bolzano
 - Sardegna
 - Liguria
 - Toscana
 - Umbria




Figura I.3.4: Utenti sottoposti a test sierologico HIV sul totale assistiti, per area geografica. Anno 2008



(*) Dati non pervenuti da oltre il 30% dei Ser.T.



Figura I.3.5: Percentuale utenti positivi al test HIV sul totale soggetti testati, per area geografica. Anno 2008



(*) Dati non pervenuti da oltre il 30% dei Ser.T.



I.3. IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE

I.3.1. Malattie infettive droga correlate

1.3.1.2. Diffusione di Epatite virale B



Prevalenza HBV

Caratteristiche	Nuovi utenti	Utenti già in carico
Test Epatite Virale B effettuati (% testati su totale in carico, esclusi i vaccinati)		
Maschi	34,1	46,5
Femmine	40,0	47,4
Totale	34,9	46,6
Positività Test Epatite Virale B (% positivi su testati)		
Maschi	14,5	35,9
Femmine	9,5	37,6
Totale	13,7	36,1

Scarso utilizzo anche del test per HBC



Figura I.3.7: Utenti sottoposti a test sierologico HBV sul totale assistiti e percentuale utenti positivi al test sul totale soggetti testati. Anni 1991 - 2008







Figura I.3.8: Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale soggetti testati, secondo il genere e il tipo di contatto con il servizio. Anni 1991 - 2008






Uso del test per HBV e prevalenza

- Regioni con minore uso del test per HBV:
 - Liguria
 - Toscana
 - Emilia Romagna
 - Basilicata
- Regioni con maggior positività all'HBV:
 - Bolzano
 - Abruzzo
 - Sardegna
 - Emilia Romagna





Figura I.3.9: Utenti sottoposti a test sierologico HBV sul totale assistiti, per area geografica. Anno 2008



(*) Dati non pervenuti da oltre il 30% dei Ser.T.



Figura I.3.10: Percentuale utenti positivi al test HBV sul totale soggetti testati, per area geografica. Anno 2008



(*) Dati non pervenuti da oltre il 30% dei Ser.T.



I.3. IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE

I.3.1. Malattie infettive droga correlate

1.3.1.3. Diffusione di Epatite virale C



Prevalenza HCV

Caratteristiche	Nuovi utenti	Utenti già in carico
Test HCV effettuati (% testati su totale in carico)		
Maschi	35,9	51,4
Femmine	38,1	55,0
Totale	36,2	51,9
Positività Test HCV (% positivi su testati)		
Maschi	25,6	65,4
Femmine	25,6	66,2
Totale	25,6	65,5

- Alta la prevalenza dell'HCV
- Basso utilizzo del test per HCV soprattutto per i nuovi tossicodipendenti afferenti ai servizi



Figura I.3.12: Utenti sottoposti a test sierologico HCV sul totale assistiti e percentuale utenti positivi al test sul totale soggetti testati. Anni 1991 - 2008







Figura I.3.13: Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale soggetti testati, secondo il genere e il tipo di contatto con il servizio. Anni 1991 - 2008






Uso del Test per HCV e prevalenza

- Regioni con minor uso del test per HCV:
 - Liguria
 - Valle d'Aosta
 - Toscana
 - Emilia Romagna
 - Lazio
- Regioni con maggior prevalenza:
 - Bolzano
 - Liguria
 - Sardegna
 - Abruzzo
 - Emilia Romagna




Figura I.3.14: Utenti sottoposti a test sierologico HCV sul totale assistiti, per area geografica. Anno 2008



Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali



Figura I.3.15: Percentuale utenti positivi al test HCV sul totale soggetti testati, per area geografica. Anno 2008



Fonte: Elaborazione su dati Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali



I.3. IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE

I.3.3. Incidenti stradali droga correlati


I.3.3.1 Quadro generale



- Le regioni a più alta mortalità:
 - Emilia Romagna
 - Veneto
 - Umbria



Figura I.3.26: Tasso standardizzato di mortalità per incidente stradale (decessi x 100.000 residenti). Anno 2007



Fonte: Elaborazione su dati ACI – ISTAT



I.3. IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE

I.3.3. Incidenti stradali droga correlati

I.3.3.2. orari degli incidenti



Tabella I.3.6: Incidenti con il concorso di assunzione di alcool secondo la fascia oraria e il giorno della settimana. Anno 2007

Fascia oraria	Lun.	Mart.	Merc.	Giov.	Ven.	Sab.	Dom.	Totale
01-03	159	87	123	128	164	399	444	1504
04-06	78	43	48	57	70	284	376	956
07-09	29	17	19	16	12	71	120	286
10-12	11	19	15	13	20	36	35	149
13-15	33	42	48	48	49	68	60	348
16-18	87	77	75	65	99	142	144	689
19-21	130	115	135	127	169	228	209	1113
22-24	87	98	86	101	168	230	187	957
Imprecis.	9	4	3	4	1	1	7	29
Totale	623	502	552	559	754	1.459	1.582	6.031



I.3. IMPLICAZIONI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE

I.3.4. Mortalità acuta droga correlata



Figura I.3.: Trend dei decessi per overdose, secondo il genere e l'anno di decesso. Anni 1999 - 2008







Figura I.3.28: Trend indicizzato dei decessi per intossicazione acuta di stupefacenti in Europa e in Italia. Anni 1985 – 2005 (Anno base 1985=100)



Fonte: Elaborazione su dati del Ministero dell'Interno - DCSA e Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze - Bollettino Statistico 2008




Alcune sottolineature

- Eroina prima sostanza responsabile
- Trend in aumento di overdose per la cocaina
- Età medie diversificate: eroina 35 anni, cocaina 32 anni
- Aumento dell'età media del decesso
- Decessi in soggetti < 19 anni: forte aumento della % delle femmine
- Trend geograficamente differenziati:
 - aumento al centro sud
 - diminuzione al nord





Figura I.3.30: Distribuzione percentuale dei decessi per overdose per area geografica. Anni 1999 - 2008



Fonte: Elaborazione su dati del ministero dell'interno - DSCN

Figura I.3.31: Tasso di mortalità per intossicazione acuta da stupefacenti (decessi x 100.000 residenti). Anno 2008

- **Umbria** regione più critica con 3 volte il tasso medio nazionale



Fonte: Elaborazione su dati ACI – ISTAT



CAPITOLO I.4. IMPLICAZIONI SOCIALI

I.4.2. Criminalità droga-correlata

I.4.2.1. Adulti tossicodipendenti ristretti in carcere




Andamento carcerazioni

- Aumento dal 2004 del numero totale di persone carcerate per vari reati (+ 12.8%) = nel 2008 erano 92.800 soggetti
- Incremento 2007 → 2008 = 2,6%
- Nel 2008: 30.528 soggetti **dichiarati** tossicodipendenti entrati in carcere - (33% del totale VS 27% del 2007), di cui:
 - 1.864 tossicodipendenti che hanno commesso il reato previsto dall'art.73 (spaccio / detenzione a fini di spaccio) del DPR 309/90, pari al 6% del totale tossicodipendenti dichiarati;
 - 26.931 contribuiscono a formare la popolazione carceraria totale in relazione alla violazione del DPR 309/90, senza essere tossicodipendenti
- Incremento 2007 → 2008 = 25,3%



Figura I.4.3: Numero di **ingressi** complessivi negli istituti penitenziari e percentuale di soggetti assuntori di sostanze illecite. Anni 2001 – 2008



Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria



CAPITOLO I.4. IMPLICAZIONI SOCIALI

I.4.2. Criminalità droga-correlata

I.4.2.2. Minori transitati per i servizi di giustizia minorile



- Diverse tipologie di servizi della giustizia minorile
- Soggetti e ingressi
- Incremento dell'8%
- La quasi totalità sono di genere maschile
- Caratteristiche dei soggetti transitati nei servizi di giustizia minorile



CAPITOLO I.5. MERCATO DELLA DROGA

I.5.1. Produzione, offerta e traffico di droga



- Grandi investimenti della malavita organizzata con aumento dell'offerta di droga
- Ruolo della criminalità organizzata
- Forte presenza di stranieri soprattutto al nord
- Organizzazioni nazionali
- Italia: snodo del narcotraffico europeo
- Forte aumento dell'offerta e dei sequestri
- Aumento delle coltivazioni autoctone al sud
- Produzione italiana anche di "super skunk"
- Tipologie di organizzazioni: "ndrangheta" e cocaina, "camorra" in espansione, "cosa nostra" e le intese con le altre cosche
- Carattere transnazionale



- Carattere transnazionale
- “Consorti” criminali per grandi acquisti
- Organizzazioni straniere molto presenti al nord per cannabis ed eroina
- Diverse le etnie coinvolte: africani, sudamericani, nordeuropei
- Le città più “colonizzate”: Milano, Roma e Brescia
- Cannabis: la più usata, arriva dalla Spagna e dall’Albania
- Cocaina: incremento del traffico, punti di arrivo soprattutto al sud
- Eroina: arriva dall’Afghanistan attraverso i Balcani, riduzione della diffusione in Europa ma aumento in stati balcanici
- Droghe sintetiche: Europa maggior produttore ed esportatore
- Italia ombelico delle vie di traffico terrestre e marittimo



CAPITOLO I.5. MERCATO DELLA DROGA

I.5.2. Sequestri di sostanze stupefacenti

I.5.2.1. Operazioni e sequestri



Figura I.5.1: Percentuale di operazioni antidroga effettuate dalle FFOO e percentuale di cannabis (chilogrammi) sequestrata. Anno 2008




Figura I.5.2: Distribuzione percentuale delle quantità di cocaina e di eroina sequestrate nel 2008







Figura I.5.4: Quantitativi di sostanze illecite sequestrate dalle FFOO nell'ambito delle operazioni antidroga. Anni 1993 - 2008



Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga



CAPITOLO I.5. MERCATO DELLA DROGA

I.5.3. Prezzo e purezza


I.5.3.1. Prezzo



Tabella I.5.3: Minori assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi di Giustizia Minorile - Anno 2008

Sostanze	Prezzo minimo	Prezzo massimo
Hashish (gr)	7,91	9,7
Marijuana (gr)	6,62	7,77
Eroina nera (gr)	40,8	52,8
Eroina bianca (gr)	53	66,33
Cocaina (gr)	66,41	90,25
Ecstasy (cp)	16,58	21,1
LSD (dose)	28	29,2

Figura I.5.5: Media dei prezzi (minimo e massimo) per dose di sostanza psicoattiva. Anni 2002 - 2008





CAPITOLO I.5. MERCATO DELLA DROGA

I.5.3. Prezzo e purezza

I.5.3.2. Purezza



Figura I.5.6: Percentuale media di sostanza pura riscontrata nelle sostanze rinvenute dalle FFOO negli anni dal 2001 al 2008

- Aumento della purezza dell'eroina
- Pressoché stabile quello della cocaina







Figura I.5.7: Variabilità nella quantità di principio attivo riscontrato nelle sostanze psicoattive illegali rinvenute dalle FFOO nel 2008






CAPITOLO 3.3

INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO



Figura III.3.2: Andamento indicizzato(*) delle segnalazioni di condotte illecite in violazione della legge sugli stupefacenti (art.73, art, 74, art.75 e art. 121) in Italia. Anni 2001 - 2006



(*) Valori indicizzati: variazione percentuale rispetto al valore dell'anno base = 2001

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la documentazione e la Statistica e Direzione Centrale per i Servizi Antidroga



CAPITOLO 3.3

INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO

III.3.1. Interventi delle Forze dell'Ordine

*III.3.1.1. Detenzione per uso personale di
sostanze illecite*



Segnalati ex art.121 del D.P.R 309/90 e successive modifiche

- Lieve diminuzione delle segnalazioni dalle Prefetture per art. 121
- maggiore diminuzione per art. 75.
- NB: Da verificare nel tempo per ritardo di notifica (2 – 3 anni)

Tabella III.3.1: Caratteristiche dei soggetti segnalati ex art. 75 alle Prefetture dalle Forze dell'Ordine - Anno 2008 (dato consolidato giugno 2009)



Caratteristiche	N	% c
Segnalati		
Segnalati ex art. 121	10.515	22,8
Segnalati ex art. 75	35.632	77,2
Totale	46.147	100,0
Genere		
Maschi	42.855	92,9
Femmine	3.292	7,1
Età media (ex art. 75)		
Maschi	24,6	
Femmine	24,4	

MEMO: Dato 2007 segnalazioni ex art. 75, consolidato al 30 aprile 2009 = 43791 segnalazioni

Tabella III.3.1: Caratteristiche dei soggetti segnalati ex art. 75 alle Prefetture dalle Forze dell'Ordine - Anno 2008

Caratteristiche	N	% c
Segnalazioni per sostanza (ex art. 75)		
Oppiacei (eroina, metadone, morfina)	4.079	10,7
Cocaina / Crack	5.770	15,1
Cannabinoidi	27.244	71,2
Stimolanti	238	0,6
Altre sostanze	940	2,4
Totale	38.271(**)	100,0
Tipo di provvedimento		
Colloqui		32.225
Formale invito		20.133
Richiesta programma terapeutico		1.078
Convocazioni		331
Sanzioni amministrative		13.823
Archiviazione atti		2.993


(*) Si fa presente che uno stesso soggetto può essere segnalato ai sensi dell'art. 75 e 121

(**) una persona può essere segnalata per più sostanze

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la documentazione e la Statistica



Figura III.3.3: Segnalazioni ex art. 75 per regione - Valori assoluti e tasso per 10.000 residenti. Anno 2007






Due sottolineature

- Aumento del trend delle persone con età maggiore di 30 anni
- Dai NOT delle prefetture:
 - diminuzione dell'età di primo consumo,
 - aumento dei policonsumatori e del consumo di alcol



Figura III.3.4: Distribuzione delle persone segnalate ex art. 75 secondo le principali fasce di età. Anni 1990 - 2008






Distribuzione percentuale delle persone segnalate ex art. 75 secondo il **tipo di sostanza**. Anni 1991 - 2008

- Sostanze di segnalazione: 71% delle segnalazioni per cannabis con riduzione del trend
- Bassa percentuale dei segnalati per sostanze a base di anfetamina
- Aumento di trend dell'uso di eroina
- Aumento del trend consumatori di cocaina

Figura III.3.5: Distribuzione percentuale delle persone segnalate ex art. 75 secondo il tipo di sostanza. Anni 1991 - 2008






- Prefetture: tendenza all'aumento delle segnalazioni per art. 75 nel 2008
- Dal 2006 riduzione del numero di soggetti inviati al programma terapeutico e aumento delle sanzioni



Figura III.3.6: Sanzioni amministrative e richieste di invio a programma terapeutico in seguito a segnalazione ex art. 75. Anni 2004 - 2008





- Fenomeno sostenuto dalla mancata sospensione delle sanzioni in caso di accettazione del programma (Legge 49/2006)
- Minorenni: 8,5% del totale dei segnalati
- Fondamentale il ruolo svolto dai NOT



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA



2008

2008

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA

dati relativi all'anno 2008

2008



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Antidroga
Via delle Vite, 13 • 00187 Roma
tel. 06/67796350 - fax. 06/67796843
dipartimentoantidroga@governo.it

Tutti i contenuti di questa pubblicazione
sono scaricabili dal sito:

www.politicheantidroga.it
www.drona.org